

**INSTRUMENTO PARA EL DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON SOSPECHA DE ARBOVIROSIS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. DENGUE-ZIKA-CHICUNGUNYA  
LA PAMPA. ENERO 2017**

Cuadro 1.

DEFINICIONES DE CASO ANTE LA SOSPECHA DE INFECCIÓN DE DENGUE, CHICUNGUNYA Y ZIKA (DENV, CHIKV y ZIKV).

SÍNDROME FEBRIL AGUDO INESPECÍFICO			ZIKA
	DENGUE	CHICUNGUNYA	
LEPTOSPIROSIS HANTAVIROSIS PALUDISMO FIEBRE AMARILLA FHA FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL ENCEFALITIS DE SAN LUIS RIQUETTSIOSIS OTRAS	<b>DOS O MÁS DE LOS SIGUIENTES SIGNOS:</b> 1-Cefalea y/o dolor retroocular. 2-Malestar general, mioartralgias. 3-Anorexia y nauseas. 4-Diarrea, vómitos. 5-Erupciones cutáneas. 6-Petequias o prueba del torniquete positiva. 7-Leucopenia, trombocitopenia. 8- Cualquier signo de alarma 9- Cualquier criterio de gravedad para dengue	En la <b>fase aguda</b> : Fiebre >38,5°C y artralgia severa o artritis de comienzo agudo, que no se explican por otras condiciones médicas.  Ocasionalmente pueden estar acompañados de manifestaciones no articulares tales como neurológicas, cardiovasculares, dermatológicas, oftalmológicas, hepáticas, renales. hematológicas y respiratorias entre otras , o pueden presentar disfunción de algún órgano o sistema con riesgo vital	Paciente que presente exantema de inicio agudo(habitualmente maculo-papular pruriginoso) <b>Y AL MENOS DOS O MÁS DE LOS SIGUIENTES SIGNOS O SÍNTOMAS:</b> 1-Fiebre, generalmente <38,5°C 2- Conjuntivitis (no purulenta/ hiperemia) 3- Artralgias 4- Mialgia 5- Edema periarticular



**Y que refiera además alguno de los siguientes antecedentes epidemiológicos:**

- Residencia o viaje a un área con transmisión local en las 2 semanas anteriores a la aparición de los síntomas.

**Sólo para Zika:**

- Contacto sexual de riesgo para Zika\* en las 2 semanas previas a la aparición de los síntomas.
- Forme parte de un conglomerado o aumento inusual de casos de fiebre o exantema en provincias con presencia del vector y se descarten otras etiologías.

\*Contacto sexual sin protección con una mujer que en las 8 semanas anteriores al contacto sexual tenga antecedente de enfermedad, residencia o viaje a un área con transmisión local del virus del Zika o con un hombre que en los 6 meses previos al contacto sexual tenga antecedente de enfermedad, residencia o viaje a un área con transmisión local del virus del Zika

Cuadro 2.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LAS INFECCIONES POR ARBOVIRUS: DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA

SIGNOS Y SÍNTOMAS	DENGUE	CHIKUNGUNYA	ZIKA
Motivo de consulta más frecuente	Fiebre, mialgia	Dolor articular, fiebre	Exantema o prurito
Fiebre	Moderada Muy frecuente Duración: 5 a 7 días <sup>a</sup>	Intensa Muy frecuente Duración: 3 a 5 días	Leve Muy poco frecuente Duración: 1 a 3 días
Exantema	Aparece del 5.º al 7.º día No característico	Aparece al 2.º o 3.º día No característico	Típicamente desde el día 1 Máculo-papular, céfalo-caudal
Prurito	Leve a intenso	Leve a moderado	Moderado a intenso
Conjuntivitis	Poco frecuente	Muy poco frecuente <sup>b</sup>	Muy frecuente
Manifestaciones neurológicas	Poco frecuente	Poco frecuente (puede ser frecuente y grave en neonatos)	Posible y grave
Cefalea	Intensa y frecuente	Leve a moderada	Leve a moderada
Dolor retroocular	Intenso y frecuente	Poco frecuente	Poco frecuente
Poliartralgias	Ausente	Muy frecuente	Frecuente
Poliartritis	Ausente	Frecuente	Frecuente
Edema de manos y pies	Poco frecuente	Frecuente	Poco frecuente
Evolución a cronicidad	No	Muy frecuente	No descrito
Mialgia	Muy frecuente e intensa	Frecuente Moderada a intensa	Poco frecuente
Hepatomegalia	Signo de alarma	Muy poco frecuente	Muy poco frecuente
Vómitos frecuentes	Signo de alarma	Muy poco frecuente	Muy poco frecuente
Diarrea	Frecuente	Muy poco frecuente	Muy poco frecuente
Dolor abdominal intenso	Signo de alarma	No se presenta	No se presenta
Sangrado de la piel	Frecuente	Muy poco frecuente	Muy poco frecuente
Sangrados de mucosas	Signo de alarma	Muy poco frecuente (cuando se presenta es grave)	Muy poco frecuente
Choque	Es la forma grave más frecuente <sup>c</sup>	Poco frecuente	No se conoce
Leucopenia	Moderada a intensa	Leve a moderada	Leve a moderada
Proteína C reactiva	Normal	Elevada	Elevada
Hematocrito elevado	Es un signo de alarma	Poco frecuente	Poco frecuente
Recuento plaquetario	Normal a muy bajo	Normal a bajo	Normal a bajo
Consideraciones particulares	Riesgo de muerte	Puede evolucionar a artropatía crónica	Riesgo de infección congénita y SGB

a En el dengue, la caída de la fiebre entre el tercer y el quinto día de la enfermedad puede asociarse al inicio de la gravedad.

b La conjuntivitis es poco común en la infección por CHIKV, sin embargo en los niños este síntoma es más frecuente.

c El choque es de rápida instalación y aparece más frecuentemente entre el tercer y el séptimo día de la enfermedad.